Folheto informativo: Informação para o utilizador

Flatub 120 mg cápsula mole
simeticone

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Flatub e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Flatub
3. Como tomar Flatub
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Flatub
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Flatub e para que é utilizado

Flatub é um antiflatulento que atua reduzindo os gases que se acumulam no estômago e no intestino.

Simeticone modifica a tensão superficial das bolhas gasosas e reduz a flatulência.

2. O que precisa de saber antes de tomar Flatub

Não tome Flatub

- se tem alergia ao simeticone ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Flatub.

Flatub não é recomendado para utilização em crianças.

Outros medicamentos e Flatub

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Flatub não interfere com a condução de veículos ou uso de máquinas.

3. Como tomar Flatub

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu farmacêutico. Fale com o seu farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose recomendada em adultos é 1 cápsula mole após cada refeição principal (almoço e jantar).

Não devem ser ingeridas mais de 4 cápsulas por dia.

Caso se tenha esquecido de tomar Flatub

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar Flatub

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Estão descritos:

- hipersensibilidade cutânea, Reações alérgicas, como erupção cutânea, comichão, inchaço da face, lábios, garganta e língua ou dificuldade em respirar
- obstipação (prisão de ventre), náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal

Em caso de aparecimento de um ou vários destes sintomas consulte o seu farmacêutico sobre o que fazer. Nunca pare o tratamento sem perguntar primeiro ao seu farmacêutico.

Se algum dos efeitos indesejáveis se agravar ou se detetar quaisquer efeitos indesejáveis não mencionados neste folheto, informe o seu farmacêutico.

Comunique ao seu médico ou farmacêutico efeitos indesejáveis detetados não constantes deste folheto.

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet:

<http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram> (preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos: Direção de Gestão do Risco de Medicamentos Parque da Saúde de Lisboa,

Av. Brasil 53 1749-004

Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Flatub

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no embalagem exterior, após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Flatub

- A substância ativa é o simeticone.
- Os outros componentes são gelatina, glicerol e água purificada.

Qual o aspeto de Flatub e conteúdo da embalagem

Flatub 120 mg são cápsulas moles, transparentes e ovais, contendo um líquido viscoso, branco-acizentado.

Embalagens de 20, 40 ou 60 cápsulas moles.

É possível que não sejam comercializadas todas as embalagens.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Cuidafarma, Lda.

Rua da Bayer, Edifício Bluepharma, São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades

3045-016 Coimbra

APROVADO EM 15-11-2023 INFARMED

Portugal

Fabricante

Alcalá Farma, S.L.
Avenida de Madrid, 82
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Espanha

Este folheto foi revisto pela última vez em <{ MM/AAAA}> <{ mês de AAAA }.>