Procto-Eze® Plus

Proporciona alívio sintomático provocado por hemorroidas e irritação anal
Ajuda a aliviar a dor, comichão e ardor

Como funciona
Procto-eze® Plus Creme é uma emulsão hidrofílica leve e suave que oferece proteção às zonas irritadas.
É um adjuvante específico para o alívio sintomático das hemorroidas internas e externas e irritação anal.
O produto cria uma barreira física que protege o tecido perianal, diminuindo a possibilidade de colonização bacteriana e contacto com impurezas externas, que podem agravar a condição hemorroidal.

Devido à sua formulação, contribui para a recuperação fisiológica da zona anal e perianal. Procto-eze® Plus Creme tem uma ação protetora, lubrificante e refrescante.

Procto-eze® Plus Creme tem propriedades emolientes que ajudam a prevenir a irritação e desconforto da zona perianal – proporciona alívio da dor, comichão e outras complicações relacionadas.

A aplicação do creme deixa a zona tratada suave e hidratada, evitando o aparecimento de irritações e fissuras na pele. A ação lubrificante ajuda a facilitar o movimento intestinal, minimizando o trauma e a sensação de dor associada à defecação.
Também facilita o processo de reparação fisiológica.
O produto não foi avaliado em mulheres grávidas ou durante a amamentação. Em caso de gravidez ou amamentação, deve consultar o seu médico ou farmacêutico.

Procto-eze® Plus Creme proporciona alívio:
- Quando tem hemorroidas internas ou externas
- Quando tem desconforto nas zonas anal e perianal, tal como comichão e ardor
- Quando tem suscetibilidade a irritações anais

Como utilizar
Procto-eze® Plus Creme é aplicado na cavidade anal e em redor da zona perianal para a aliviar os sintomas associados a hemorroidas e irritação anal.

APLICAÇÃO EXTERNA
Em caso de desconforto na zona anal externa, aplique Procto-eze® Plus Creme com o dedo e massaje suavemente. O produto também pode ser utilizado antes do movimento intestinal de modo a facilitar a defecação (tenha sempre o cuidado de lavar bem a área afetada e as mãos antes e depois da utilização do produto).

APLICAÇÃO INTERNA
Procto-eze® Plus Creme vem com um aplicador especial que pode ser adaptado à bisnaga. Este aplicador permite a aplicação na cavidade anal.

Tenha sempre o cuidado de lavar bem a área afetada e as mãos antes e depois da utilização do produto.

1. Retire a tampa da bisnaga e utilize a parte de trás da tampa para perfurar a zona selada da bisnaga, antes da primeira utilização.
2. Adapte o aplicador à abertura da bisnaga e insira suavemente na cavidade anal (também pode aplicar uma camada fina de creme na ponta do aplicador de modo a facilidade a inserção na cavidade anal).
3. Aperte a bisnaga de forma a permitir a saída de uma quantidade suficiente de creme.
4. Depois da utilização, limpe cuidadosamente o aplicador com uma toalha de papel molhada e deixe secar.
5. Quando terminar, coloque a tampa no aplicador.

Aplicação
Aplique o produto sempre que seja necessário, até três/quatro vezes por dia.
Para prevenir a irritação anal e fissura da pele, é possível aplicar Procto-eze® Plus Creme uma vez por dia.

Composição
AQUA, OLUS OIL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PETROLATUM, CETEARETH-20, CETEARYL ALCOHOL, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ISOSTEARYL ALCOHOL, PEG-75 STEARATE, GLYCERYL STEARATE,

PROPYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, PEG-8 STEARATE, ISODECYL LAURATE, AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, OLEYL ALCOHOL, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, HYDROGENATED LECITHIN, POTASSIUM SORBATE, STEARYL GLYCYRRHETINATE, MALTODEXTRIN, ALLANTOIN, PARAFFIN, DISODIUM EDTA, ZANTHOXYLUM BUNGEANUM FRUIT EXTRACT, LACTIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, LAURETH-3, HYDROXYETHYLCELLULOSE, TOCOPHEROL, ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER.

Efeitos indesejáveis
Não existem efeitos indesejáveis conhecidos relacionados com o uso de Procto-eze® Plus Creme, contudo:
- Não utilize de tiver hipersensibilidade a qualquer um dos componentes.
- Em caso de dúvidas, aplique uma pequena quantidade de creme na parte de dentro do antebraço. Caso apareçam manchas vermelhas e irritáveis, não deve utilizar o produto.
- Informe o seu médico ou farmacêutico de quaisquer efeitos indesejáveis ou se os sintomas persistirem.

Advertências
Destinado apenas para uso individual e não deve ser partilhado.
Manter fora do alcance das crianças.
Conservar num local seco, protegido da luz e à temperatura ambiente (entre 5º e 30ºC).
Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
Não utilizar após a data de validade indicada na embalagem.
Não ingerir.
Evitar contacto com os olhos. Em caso de contacto com os olhos: enxaguar bem com água e eventualmente procurar aconselhamento médico.
Depois de utilizar, limpar cuidadosamente o aplicador, deixar secar e tapar o aplicador com a tampa.
Se os sintomas persistirem para além dos 30 dias iniciais, procure aconselhamento médico.
O produto não foi avaliado em mulheres grávidas ou durante a amamentação. Em caso de gravidez ou amamentação, deve consultar o seu médico antes de utilizar.

Tenha em atenção
Em caso de queixas persistentes ou recorrentes, deve contactar sempre o seu médico.
Adicionalmente, em caso de agravamento ou quando ocorrerem sintomas de inflamação, reação alérgica ou infeção, consulte um médico.

Possíveis interações
De momento não existem interações conhecidas entre o produto e outros medicamentos ou dispositivos médicos. Contudo, no caso de uso concomitante, continuado e prolongado com medicamentos, em particular com anticoagulantes, antiplaquetários ou sedativos, deve consultar um médico antes da aplicação deste produto.

Tamanho: Bisnaga de 30ml com aplicador reutilizável. CE

CE 0477

Biokosmes s.r.l. – socio unico
Via dei Liveli 1, 23842 Bosisio Parini (LC),
Itália - Fabricado em Itália
Sob licença de Venture Life Ltd, Bracknell, RG12 2XB, Reino Unido
www.venture-life.com

Distribuidor:
Cuidafarma, Lda.
Rua da Bayer, Edifício Bluepharma
3045-016 Coimbra - Portugal

Data de Revisão: 01-2020

Símbolo	Significado
CE 0477	Marca CE emitida pelo organismo notificado 0477
	Fabricante
	Ver as instruções antes da utilização do produto
30°C 5°C	Conservar entre 5ºC e 30ºC
	Data de validade
LOT	Número de Lote